



T.C.

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI  
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ  
RUHSATNAMESİ

İTHAL

Ruhsat No: 8960.....

Ruhsat Tarihi: ..... 18.12.2012

Ticari Adı

: MENTA ANJELİK.....

Aktif Madde ve Oranı

: 250 g/l Azoxystrobin.....

Grubu

: Fungusit.....

Fiziki Hali

: Açık sarı akışkan konsantre süspansiyon.....

İmalatçısı

: China Jiangsu International Economic Technical.....

Ruhsatname Verilen İthalatçısı

: Cooperatin Corporation(Add.No:5 Beijing (W)Road

Ruhsatnamenin Geçerli Olduğu Süre

: Nanjing, Jiangsu China(Büro).....

Düzenleme Tarihi ve Nedeni

: Shanghai Heben-Eastsun Medicaments Co.Ltd.....

: Add.No:2 Linbaoroad South of Tinglin Industrial Park

: Jinshan Shanghai China(Fab.).....

: Menta Tarım İlaçları San.ve Tic.Ltd.Şti.Mersin Tarsus

: Organize Sanayi Bölgesi 1.Cadde No:1 Mersin.....

: Tarihine kadar.....

: 18.12.2012 Emsal.....

5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince yukarıda adı geçen bitki koruma ürününün Türkiye'de imal ve kullanılmasına müsaade edilmiştir.

Dr. Nevzat BİRİŞİK  
Bakan a.  
Genel Müdür Yardımcısı V.

İma Tarihi :  
Son Kullanma Tarihi :  
Şarij No :  
Ruhsat Tarihi ve No'su :

## KULLANILACAGI BITKI VE ZARARLI ORGANIZMALAR

BITKİ ADI	ZARARLI ORGANİZMA ADI	KULLANMA DOZU	SON İLAÇLAMA İLE HASAT ARASI SÜRE
*Bağ	Bağ Mildiyosu ( <i>Plasmopara viticola</i> ) Kullemle ( <i>Erysiphe cichoracearum</i> ) Ölü Kol ( <i>Phomopsis viticola</i> ) (Yaz İlaçlaması)	75 ml / 100 L su 75 ml / 100 L su 75 ml / 100 L su	21 gün 21 gün 21 gün
Hıyar	Mildiyö ( <i>Psidoperonospora cubensis</i> ) Kullemle ( <i>Erysiphe cichoracearum</i> , <i>Sphaerotheca fuliginea</i> ) Kullemle ( <i>Phytophthora infestans</i> )	60 ml / 100 L su 75 ml / 100 L su 75 ml / 100 L su	3 gün 3 gün 3 gün
Kabak	Mildiyö ( <i>Phytophthora infestans</i> )	75 ml / 100 L su	3 gün
Domates(Tartar)	Erken Yaprak Yanıklığı ( <i>Alternaria solani</i> )	75 ml / 100 L su	3 gün
Karpuz	Erken Yaprak Yanıklığı ( <i>Alternaria cucumerina</i> )	75 ml / da	3 gün
Biber (Sera)	Kullemle ( <i>Leveillula taurica</i> )	75 ml / 100 L su	3 gün

\*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmamız.

### BITKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜJN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan ilaç önce ayrı bir kaptı bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinasının deposu yarıya kadar sıyla doldurulur. Makinanın karıştırıcı çalışılmış durumdayken ilaç su depoya ilave edilir. Karıştırma devam edilerek depo sıyla tamamlanır. İlaçlama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan ilaç aynı gün içerisinde kullanılır.

**KALIBRASYON:** İlaçlama öncesinde ilaçlama makinasının kalibrasyonu yapılmalıdır. İlaçlamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde ilaç su miktarı ayarlanmalıdır. İlaçlamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

### İlaçlama Makinasının Temizliği:

İlaçamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinasının deposunu güvenili bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcı ve püskürme sistemi çalıstıratırak tüm parçaların yıkamasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapmayın. Yıkama suyunu ve atıklarını su kaynaklarına boşaltmayıınız.

# MENTA ANJELİK

## Suspansyon Konsantre (SC)

GRUBU	C3,11	FUNGİSIT (Mantar İlacı)
Aktif Madde ve Oran: Litrede 250 g / l Azoxystrobin		

Aktif Madde ve Oran: Litrede 250 g / l Azoxystrobin

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.  
EVDE KULLANMAYIN.

ÇOCUKLARDAN VE GİDALARDAN UZAK TUTUNUZ.  
BITKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA  
HİÇBİRSEY YEMEYİNİZ. SIGARA İÇMEYİNİZ.  
DERİ VE GöZ İLE TEMASINDAN KAÇININIZ.

BITKİ KORUMA ÜRÜNÜNUN BUHARINI VE ZERRELERİNİ  
TENEFÜS ETMEYİNİZ.  
BITKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN  
İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.

İNAN VE ÇEVRE SAGLIĞI ÜZERINE RİSKLERİ ÖNLEMEK  
İNİN KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.

**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI  
KEŞİNLİKLE YASAKTIR.**

KULLANILAN İLACIN BOS AMBALAJININ DÖRTTE BİRİNE  
KADAR TEMİZ SU KOYAR İYİCE ÇALKALAYINIZ.  
ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ.  
BU İŞLEMİ ÜÇ SEFER TEKRARLAYINIZ.

### ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Önemli mikarda alınmasını takiben mide bulantısı, kusma ve karın ağrısıyla birlikte ishal görülebilir.

### İLK YARDIM TEDBİRLERİ:

Gözler: Etkilenen gözleri, gözkapakları açık ve nazik şekilde en az 15 dakika süreli olarak yıkayın. Gözde kontakt lens var ise, lensleri çıkarmaya başladıkta 5 dakika sonra çıkartın daha sonra gözleri yıkamaya devam edin. Medikal destek için bir sağlık merkezini veya ulusal zehir kontrol merkezini arayın (Telefon: 114).

Net Miktarı  
Azami Per. Satış Fiyatı (KDV Dahil) :  
İÇİNDEKİLER: Azoxystrobin içeriği.  
ZARARLILIK İŞARETLERİ



### DİKKAT

**ZARARLILIK İFADELERİ (H)**  
H432: Solunması halinde zararlıdır.

**ÖNLEM İFADELERİ (P)**  
P201: Cocukların erişmeyeceği yerde saklayın.  
P202: Büttün önem ifadeleri okunup anlaşılmadan elleçlelmeyin.

P261: Tozunu / dumanını / gazını / sisini / buharını / spreyini solumaktan kaçının.  
P273: Çevreye verilmesinden kaçının.

P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.  
P304+P340: Kurbanı temiz havaya çıkarın ve zorlaşmış ise, Kurbanı temiz havaya çikartın ve kolay biçimde netes almasi için rahat bir pozisyonda tutun.

P312: Kendinizi iyi hisselenmeseniz, ZEHİR MERKEZİNİ veya doktoru/hekimini arayın.  
P391: Döküntülerin toplayın.

P501: İcerigü/kabi kimyasal atık olarak bertaraf edin  
EUH401: İnsan sağlığını ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanım talimatlarına uygun.

08 Mart 2017

GİDA TARIİM VE HAYVANCUK BAKANLIĞI  
GİDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR.

MENTA ANJELİK İLAÇLAR SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

Mersis: Tarsus 09 Sayı: Bol Cumhuriyet Bul.  
1 Cad No:1 HÜZÜRKENT / AKDENİZ / MERSİN  
Te:0324-676 52 52 Faks:0324 676 45 97  
İletişim VD: 615 002 8377

### **Bitti Koruma Ürtününün Kullanım Şekli:**

**Bağda Middiyö:** İlk uygulamaya sürgüler 25-30 cm ulaşınca başlanmalıdır. İkinci ve sonraki ilaçlamalar ilaçlama yapılırlı.

**İlaçlama: Bülgelere göre değiştirmekle beraber sürgülerin 25-30 cm uzunluğa ulaştığında,**

**1. İlaçlama: Cicek taç yaprakları döküldüğünde, 2. İlaçlama: İkinci ilaçlamadan sonra kullanılan ilaç etki süresine göre, tanelere ben dişme döneminde kada yapılır.**

**Yaz İlaçlaması:**

1. ilaçlama sürgüler 2-3 cm olduğunda,  
2. ilaçlama sürgüler 8-10 cm olduğunda,  
3. ilaçlama sürgüler 25-30 cm'yi bulduğunda devrede yapılır.

Bağda bir sezon içinde MENTA ANJELIK ile ilaçlama sayısı 4'ü geçmemeli, 3'ten fazla üst üste kullanılmamalıdır.

**Hiyar Middiyö:** İlaçlama bitkiler kol atmaya başladığında veya ilk middiyö belirtilisinin görülmesi ile ilaçlamaya başlanır ve hastalığın şiddetine göre ilaçlamaların bitkinin her tarafını, özellikle yaprak attıkları kaplayacak şekilde yapılması gerekmektedir.

**Hivar ve Kabak Kütleme:** İlk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. Hasatlığın şiddetini, iklim koşulları ve ilaçın etkinlik süresine bağlı olarak ilaçlamaya devam edilmelidir. Günlük sıkaklı ortalamasının 27 C'nin üstünde ve orantılı nemin de %50'nin altında olduğu zamanlarda ilaçlamaya ara verilmelidir.

**Domates (Tara) Middiyö:** İlaçlı mücadeleye çevrede veya tarada ilk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamaya başlanır. Hastalığın seyrine ve iklim koşullarına göre 10-12 gün aralıklarla ilaçlamaya devam edilir.

**Dormates Erken Yaprak Yankılığı:** Gerek fidelikte gerekse tarlada ilaçlamaya ilk lekeler görülür göründmez başlanmalıdır. İklim koşulları hastalık gelişimi için uygun olduğunda ilaçın etki süresine bağlı olarak ilaçlama tekrarlanmalıdır.

**Karpuz Erken Yaprak Yankılığı:** Kimyasal ilaçlama yeşil aksam ilaçlamalar şeklinde uygulanır. Çevrede ilk belirtilerin görülmemesiyle ilaçlamaya başlanmalıdır. Hastalığın şiddeti, iklim koşulları ve ilaçın etkinlik süresi dikkate alınarak 10-12 gün aralıklarla ilaçlamaya devam edilir.

**Biber (Sera) Kütleme:** Bitkiler üzerinde ilk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamalara başlanmalı ve 10-12 gün aralıklarla ilaçlamala devam edilmelidir.

**Bitki tahammülü:** Tavsiye edildiği şekilde kullanılanlarında, MENTA ANJELIK ilaçının, tavsiye edildiği ürünler üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi yoktur.

**DIRİNG YÖNETİMİ:** MENTA ANJELIK adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup C3, 11 olarak sınıflandırılmış bir fungistittir. Ayni etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini tesvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için MENTA ANJELIK'in aynı üretilen sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (grup C3, 11 haric) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

**KARŞABILIRLIK DURUMU:** MENTA ANJELIK'in domateseki uygulamalarında yayıcı ve yapıstırıcılarla karıştırılarak kullanılması önerilmez.

## **MENTA® ANJELIK**

**Süsponsiyon Konsanitre (SC)**

GRUBU	C3,11	FUNGİST (Mantar İlacı)
-------	-------	---------------------------

### **Aktif Maddde ve Oranı:** Litredede 250 g / Azoxystrobin

**Deri:** Temas eden bölgeyi acı olarak, en az 15 dakika içinde yitirin. **Zehir kontrol merkezlerini arayın (Telefon: 114).**

**Solunum:** Etkileren kişinin sakinleşmesini sağlayın ve kişiyi temiz havaya taşıyın. Kişi nefes alamıyorsa, acilen bir ambulans çağrırin ve kişiye suni nefes yapın. **Medikal destek için bir sağlık merkezini veya julosal zehir kontrol merkezlerini arayın (Telefon: 114).**

**Sindirim:** Acıl olarak medikal ve zehir kontrol merkezlerini arayın. Etkilenen kişikusma zorlamayın. Kişi eğer içebilecek durumdayrsa, kişinin ağızını çalkalayın ve 200-300 mL kadar suyu yavaşça için. Blinici açık olsayan kimseye ağızdan bir şey vermeyin.

**ANTİDÖTU VE TEDAVİSİ:** Özel bir antidiotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır. Midevi midde muhelyiyatının solunum yolunu kaçamasına dikkat ederek yıkayınız. Mangal kömürü ve müşhi ilaçı veriniz. Sonra semptomatik tedavi uygulayınız.

**ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) Tel:114**  
Sadecə zehirlenme durumlarda arayınız.

**RUHSAT SAHİBİ VE İTHALATÇI FIRMA:**  
MENTA TARIM İLAÇLARI San. ve Tic. Ltd. Şti.  
Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde  
No:1  
Huzurkent / MERSİN  
Tel: 0 324 676 45 95 -96 Fax:0 324 676 45 97

**Sadece zehirlenme durumlarda arayınız.**

**DEPOLAMA DURUMU:**  
Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadın depolandığında 2 yıl süre ile ilaçın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

**FİRMA BEYANI:**  
Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar ilaçlarının kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ilaçlarının hatalı depolanması veya tavyışlere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

**GİDA TARM ve HAYVANÇİLİK BAKANLIĞI**  
GİDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR.

08 Mart 2017

GİDA TARM ve HAYVANÇİLİK BAKANLIĞI  
GİDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR.

MENTA TARIM İLAÇLARI SAN ve TIC. LTD. ŞTİ.

Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde  
No:1  
Huzurkent / MERSİN  
Tel: 0 324 676 45 95 -96 Fax:0 324 676 45 97

0 324 676 45 95  
0 324 676 45 97