



T.C.
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK
BAKANLIĞI

T.C.
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


BITKİ KORUMA ÜRÜNLERİ
RUHSATNAMESİ

İMAL

Ruhsat No: **10646** Ruhsat Tarihi: **20.05.2016**
Ticari Adı : **ANTIQUE**
Aktif Madde ve Oranı : **650 g/l Malathion**
Grubu : **Insektisit**
Fiziki Hali : **Berrak, Sarı Renkli Sıvı**
Ruhsat Sahibinin Adı ve Adresi : **MENTA TARIM İLÇ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Mersin
Tarsus Organize Sanayi Bölgesi 1. Cad. No: 1
Huzurkent MERSİN**
Fabrika veya İmalathanenin İşletme
İzni Tarih ve Numarası : **22.05.2006/11-178**
Fabrika veya İmalathanenin Adresi : **MENTA TARIM İLÇ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Mersin
Tarsus Organize Sanayi Bölgesi 1. Cad. No: 1
Huzurkent MERSİN**
Ruhsatının Geçerli Olduğu Süre : **20.05.2026 (Yirmi Mayıs İkbinyirmialtı)
tarihine kadar**
Düzenlenme Tarihi ve Nedeni : **20.05.2016 Emsal**

5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince yukarıda adı geçen bitki koruma ürününün Türkiye’de imal ve kullanılmasına müsaade edilmiştir.




Dr. Yunus BAYRAM
Bakan a.
Genel Müdür V.

İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi :
Şarj No :
Ruhsat Tarihi ve No'su :

MENTA

ANTIQUE

Emülsiyon Konsantre (EC)

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu ve Dönemi	Son Uygulama ile Hesat Arasındaki Süre
Domates	Yeşil kurt (<i>Helicoverpa armigera</i>)	200 ml/da larva	7 gün
Fasulye	Fasulye kapsül kurdü (<i>Etiella zinckenella</i>)	200 ml/da larva	7 gün
Mısır	Çizgili yaprak kurdü (<i>Spodoptera exigua</i>)	200 ml/da larva	7 gün
	Mısır ambar zararlıları	200 ml/100 m ² Ambar uygulaması	-
Kayısı	Şeftali güvesi (<i>Anarsia lineatella</i>)	150 ml/ 100 l su larva	7 gün
*Bağ	Unlubıt (<i>Planococcus citri</i>)	150 ml/ 100 l su Tüm dönemlerde	7 gün
Süs Bitkileri	Gül yaprakbıt (<i>Macrosiphum rosae</i>)	85 ml/100 l su nimf, ergin	7gün
Yağ gülü	Gül yaprakbıt (<i>Macrosiphum rosae</i>)	85 ml/100 l su nimf, ergin	7gün
Haşhaş	Haşhaş kökkurdu (<i>Ceuthorrhynchus dentifolius</i>)	200 ml/ 100 l su ergin	7 gün
	Pamuk çizgili yaprakkurdü (<i>Spodoptera exigua</i>)	250 ml/da larva	7 gün
Pamuk	Pamuk yaprakbıt (<i>Aphis gossypii</i>)	100 ml/da ergin, nimf	
	Yaprak pırelen (<i>Empoasca decipiens</i>) (<i>Asymmetrasca decedens</i>)	170 ml/da ergin, nimf	
Susam	Susam güvesi (<i>Ambigistra catalaunalis</i>)	100 ml/da larva	7 gün
Soya	Piskokulu yeşil böcek (<i>Nezara viridula</i>)	170 ml/da	7 gün
	Pamuk çizgili yaprakkurdü (<i>Spodoptera exigua</i>)	250 ml/da	
Hububat	Ambarlanmış hububat ve mamulleri zararlılarına karşı	200 ml/100 m ² yüzeye boş depo uygulaması	Ürün depoya konulmadan 20-25 gün evvel
Zeytin	Zeytin kabuklubıt (<i>Parlatoria oleae</i>)	150 ml/100 l su larva	7 gün

KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

GRUBU	1B	İNSEKTİSİT (Böcek ilacı)
-------	----	--------------------------

Litrede 650 gr. Malathion

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ. EVDE KULLANMAYINIZ. ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ. BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN BUHAR VE ZERRECİKLERİNİ SOLUMAYINIZ. BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HIÇBİRŞEY YEMİYİNİZ. SİGARA İÇMEYİNİZ. DERİ VE GÖZ İLE TEMASINDAN KAÇININIZ. BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 7 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ. İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN, KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

KULLANILAN BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ BOŞ AMBALAJININ DÖRTTE BİRİNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU UYGULAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ ÜÇ KEZ TEKRARLAYINIZ.

Net Miktarı :
Azami Per. Satış Fiyatı (KDV Dahil) :

İÇİNDEKİLER: Malathion

ZARARLILIK İŞARETLERİ



TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ (H)

H302: Yutulması halinde zararlıdır.
H315: Cilt tahrişine yol açar.
H317: Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
H319: Ciddi göz tahrişine yol açar.
H226: Alevlenir sıvı ve buhar.
H410: Sıcak ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.
EUH208: Malathion içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

ÖNLEM İFADELERİ (P)

P102: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
P202: Bütün önlem ifadeleri okumak anlaşılmalıdır.
P210: Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. - Sigara içilmez.
P270: Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz veya sigara içmeyin.
P273: Çevreye verilmesinden kaçınınız.
P280: Koryucuyu eldiven/koryucuyu kıyafet/göz koryucuyu/üz koryucuyu kullanın.
P301+P312: Yutulduğunda: Kendinizi iyi hissetmiyorsanız zehir merkezini veya doktoru/hekimi arayın.
P303+P361+P353: Deri (veya saç) ile temas halinde ise: Kirlenmiş tüm giysilerinizi hemen kaldırın/çıkartın. Cildinizi su/duş ile durulayın.
P305+P351+P338: Göz ile teması halinde: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.
P333+P313: Ciltte tahriş veya kaşıntı söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.



MENTA
TARIM İLAÇLARININ ve TIC LTD. STİ.
Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde
No:1 Tarsus / MERSİN
Tel: +90 324 676 45 95-96 Fax: +90 324 676 45 97
www.mentatarm.com / menta@mentatarm.com
Uray V.D.: 615 002 8377 Tic. Sic. No: 32260

*Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdakten karışım deposu ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan karışımı aynı gün içinde kullanınız.

16 Kasım 2017

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

MENTA®

ANTIQUE

Emülsiyon Konsantr (EC)

GRUBU	1B	İNSEKTİSİT (Böcek ilacı)
-------	----	-----------------------------

Litrede 650 gr. Malathion

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Kandaki kolinesteraz enzimini inaktive eder. Baş ağrısı, baş dönmesi, sinirlilik, görme bozukluğu ve bulamıklık, halsizlik, iştah, solunum zorluğu, terleme, salya, kusma, morarma, göz bebeklerinin küçülmesi, titreme, kaşlarda seyirme, kasılma ve refleks bozukluğu.

İLK YARDIM TEDBİRLERİ:

Gözler: Etkilenen gözleri, gözkapakları açık ve nazik şekilde en az 15 dakika sürekli olarak yıkayın. Gözde kontakt lens var ise, lensleri yıkamaya başladıktan 5 dakika sonra çıkartın daha sonra gözleri yıkamaya devam edin. Medikal destek için bir sağlık merkezini veya ulusal zehir kontrol merkezlerini arayın (Telefon: 114).

Deri: Temas eden bölgeyi acil olarak, en az 15 dakika iyice yıkayın. Medikal destek için bir sağlık merkezini veya ulusal zehir kontrol merkezlerini arayın (Telefon: 114).

Solumum: Etkilenen kişinin sakinleşmesini sağlayın ve kişiyi temiz havaya taşıyın. Kişi nefes alamıyorsa, acilen bir ambulans çağırın ve kişiyi suni teneffüs yapın. Medikal destek için bir sağlık merkezini veya ulusal zehir kontrol merkezlerini arayın (Telefon: 114).

Sindirim: Acil olarak medikal ve zehir kontrol merkezlerini arayın. Etkilenen kişi kusmaya zorlanmayın. Kişi eğer içebilececek durumdaysa, kişinin ağzını çalkalayın ve 200-300 mL kadar suyu yavaşça içirin. Bilinci açık olmayan kimseye ağızdan bir şey vermeyin.

ANTİDÖTÜ VE TEDAVİ:

ANTİDÖTÜ: ATROPİN SÜLFAT, PAM VE TOXOGONIN'dir. Atropin sülfat zehirlenmenin şiddetine göre 2-3 mg./dan başlayarak 100 mg'a kadar verilebilir. Belirti ve şiddetine göre doktor tedavisi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) Tel:114

Sadece zehirlenme durumlarında arayınız.

16 Kasım 2017

YILDIRIM
GIDA VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
KABUL EDİLMİŞTİR.

KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

UYGULAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Mısırda pamuk çizgili yaprakkurduna karşı: tarlayı temsil edecek şekilde 5 noktada sıra üzerindeki yan yana 5'er bitki olmak üzere toplam 25 bitki kontrol edilecek larvalar sayılır. Uygulama ortalama 2 larva/bitki olduğunda yapılır.

Parmukta pamuk yaprakbittine karşı: tarla kontrollerinde yaprakbitti ile birlikte faydalı böcekler yoğun ise uygulama ertelemelidir. Fide döneminde seyretmeden sonra %50 bulaşık fide, tarla döneminde ise 1 yaprakta ortalama 25 yaprakbitti saptandığında uygulama yapılmalıdır.

Pamuk yaprakpirelerine karşı: rastgele seçilen bitkilerin ana gövdesine ait alt, orta ve üst kısmından alınan 1'er adet olmak üzere toplam 25 yaprağın tamamındaki yaprakpireleri sayılır. Bu şekilde tüm alandan toplam 100 yaprakta yaprak başına ortalama zararlı sayısı bulunur. Yaprak başına ortalama 10 adet yaprakpinesi saptandığında uygulama yapılmalıdır.

Parmukta pamuk çizgili yaprakkurduna karşı: yapılan kontrollerde 100 bitkide 10 adet larva veya yeni açılmış 2 yumurta paketi görüldüğünde uygulama yapılır.

Bağda unlu bütte karşı: mücadele iki dönemde yapılır. Birinci dönem; asmanın gövdesinde kabuklarda islatlık görülümeye başladığı ve unlu bütten yeşil aksama doğru ilerlemeye başladığı dönemdir. Bu dönemde koruklar yaklaşık nohut büyüklüğünde olup yalnız unlu bütten görüldüğü asmalar ilaçlanmalıdır. İkinci devre, unlu bütten yaprak ve salkımlara geçtiği, tanelerin tatlanmaya başladığı devredir. Asmaların çoğunda bulaşma saptanır ve ayrıca ihraç edilen çeşitlerde her iki dönemde de ilaçlama yapılabilir.

Gül yaprakbittine karşı: yapılan sayımlarda 100 gül sürgününün 20'sinde, sürgün ve taze yaprakların alt yüzünde yaprakbitti kolonileri görülümeye başladığı zaman uygulamaya geçilir.

Haşhaşta haşhaş kökkurduna karşı: mart ile nisan ortası arasında, erginlerin topraktan çıkışları en yüksek yoğunluğa ulaştığı ve m karede en az 10 adet ergin görüldüğünde, yumurta bırakmadan önce uygulama yapılmalıdır.

Susam güvesine karşı: zararlı ile bulaşık bitki oranı %20 olduğunda kimyasal mücadele uygulanır.

Soyada pamuk çizgili yaprakkurduna karşı: 3 m sıra uzunluğunda 6 larva veya yeni açılmış 2 yumurta paketi bulunduğu mücadelede uygulanır.

Soyada piskokulu yeşilböceğe karşı: 3 m'lik sıra uzunluğunda ortalama 8 adet ergin+nimf saptandığında kimyasal mücadele uygulanır.

Kayısıda şeftali güvesine karşı: uygulama zamanının saptanmasında eşeyssel çekici tuzaklar, etkili sıcaklıklar toplamı ve bitki fenolojisinden yararlanılır.

Domatese yeşil kurta karşı: tarlaya köşegenler yönünden girilip, tarlaların büyüklüğüne göre 50-100 bitki kontrol edilerek, bitkinin çiçek, yaprak, sap ve sürgünlerinde, yumurta ve larva aranır. 100 bitkiden 5'i bulaşık bulunmuş ise uygulama yapılır.

Fasulyede fasulye kapsülkurduna karşı: yeşil aksam uygulaması şeklinde uygulanır. Boş depolarda bütün yüzeyleri ıslatacak şekilde uygulama yapılır.

DİRENÇ ŞEKLİ:

ANTIQUÉ adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 1B olarak sınıflandırılmış bir insektisit tir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için ANTIQUÉ 'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 1B hariç) aynı ilaç yerine hastalığa karşı ruhsat almış diğer bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞILIRLIK DURUMU:

Dinitro bileşikleri ve Metalaxyl'li bitki koruma ürünleri ile karıştırılmamalıdır. Alkali bitki koruma ürünleri ile karıştırıldığında kalıcı etkisi azalabilir. Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılmadan önce ön karışım testi yapılması tavsiye edilir.

P337+P313: Göz tahrişi kalıcı ise: Tıbbi yardım/bakım alın.

P261: Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyni solumaktan kaçının.

P370+P378: Yangın durumunda: Söndürme için kuru kimyasal, karbon dioksit, su spreyi veya köpük (alkole dirençli köpük) kullanın.

P501: İçeriği/kabı kimyasal atık olarak bertaraf edin.

EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörüt (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar ilağlarının kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ilağlarının hatalı depolanması veya tavsiyelere uymadaki eksiklikler neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHİBİ VE İMALATÇI FİRMA:

MENTA TARIM İLAÇLARI San. ve Tic.Ltd. Şti.
Mersin- Tarsus Organize Sanayi Bölgesi 1. Caddesi No:1
Huzurkent / MERSİN
Tel: 0 324 676 45 95 -96 Fax:0 324 676 45 97

MENTA®
TARIM İLAÇLARI SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi 1. Caddesi
No: 1 Huzurkent / MERSİN
Tel: +90 324 676 45 95 96 Fax: +90 324 676 45 97
www.mentatarim.com
mentata@mentatarim.com
Uray V.D.: 61500083274e-Şic: No: 32260

