

T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü




**BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ
RUHSAT BELGESİ**

İMAL

Ruhsat No:	12053	Ruhsat Tarihi:	15.09.2021
Ticari Adı		:	ARYA
Grubu		:	Fungisit
Aktif Madde ve Oranı		:	700 g/l Metalik bakıra eşdeğer bakır oksiklorid
Formülasyon Şekli		:	SC (Akıcı Konsantre/Süspansiyon Konsantre)
Görünüşü		:	Mavi Renkli Sıvı
Ruhsat Sahibi Firma Adı ve Adresi		:	MENTA TARIM İLÇ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi 1.Cadde No:1 Huzurkent Tarsus / MERSİN
Üretici Firmanın Adı ve Adresi		:	MENTA TARIM İLÇ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi 1. Cad. No: 1 Huzurkent / MERSİN
Üretim Tesisinin, Üretim İzin Tarih ve Numarası		:	14.11.2014 / 31 - 326
Ruhsat Belgesinin Geçerli Olduğu Süre		:	15.09.2031 (Onbeş Eylül İkibinotuzbir) tarihine kadar
Düzenlenme Tarihi ve Nedeni		:	15.09.2021, Emsal

5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ve Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması ve Piyasaya Arzı Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince yukarıda adı geçen bitki koruma ürününün Türkiye'de imal ve kullanılmasına müsaade edilmiştir.




Dr. Yunus BAYRAM
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı

İmal Tarihi :
Son Kullanma Tarihi :
Serj No :
Ruhsat Tarihi ve No'su : 15.09.2021 / 12053

KULLANILACAKI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

BİTKİ ADI	ZARARLI ORGANİZMA ADI	UYGULAMA DOZU	SON UYGULAMA İLE HESAT ARASI SÜRE
*Bağ	Mildiyö (<i>Plasmopara viticola</i>)	200 ml / 100 L su	14 gün
Şeftali	Şeftali yaprak kıvrıklığı (<i>Taphina deformans</i>)	300 ml / 100 L su	7 gün
Bağ	Bağda olukol (<i>Phomopsis viticola</i>)	200 ml / 100 L su yaz ilaçlaması	14 gün
Zeytin	Zeytinlerde halkalı leke (<i>Splacaea oleaginea</i> = <i>Cycloconium oleagninum</i>)	150 ml / 100 L su	14 gün
Kayısı	Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen (çil) (<i>Missonomyces carpophylus</i> = <i>Stigmata carpophila</i>)	200 ml / 100 L su	90 gün
Domates**	Mildiyö (<i>Phytophthora infestans</i>) Erken yaprak yanıklığı (<i>Alternaria solani</i>)	100 ml / da*** (200 ml / 100 L su)	14 gün

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmamaz.

(***) Domates bitkilerinin gelişmelerinde durgunluk yapabileceğinden kurak iklim şartlarında bakrılı ilaçların tavsiyesinden kaçınılmalı, ancak organik fungusitlerin bulunmadığı yerlerde bakrılı ilaçlarla en fazla 1-2 uygulama yapılmalıdır.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumda iken karışım depoya ilave edilir. Karşıtırmaya devam edilerek depo suya tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karşıtırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü ayrı gün içinde kullanılır.

Kalibrasyon: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

*** Domates mildiyösü için dekara uygulamalarda 50 litre su kullanılmaktadır.

15 Eylül 2021

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR.

MENİTA®

ARYA

Süspansiyon konsantre (SC)

GRUBU	M1	FUNGİSİT (Mantar İlacı)
700 g / L Metalik Bakıra Eşdeğer Bakır Oksiklorid		

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.

EVDE KULLANMAYINIZ.

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA

HİÇBİR SEY YEMİYİNİZ. SİGARA İÇMEYİNİZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ KULLANILMIŞ SAHAYA 1 GÜN

SÜRE İLE İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEM EK İÇİN KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.

TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

KULLANILAN ÜRÜNÜN BOŞ AMBALAJLARININ İÇİNE 1/4'ÜNE KADAR TEMİZ SU KOYARAK İYİCE ÇALKALAYINIZ. ÇALKALAMA SUYUNU İLAÇLAMA TANKINA BOŞALTINIZ. BU İŞLEMİ 3 SEFER TEKRARLAYINIZ.

ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Özel bir antidotu yoktur. Aktif komürle mide yıkamır. Kan dolaşımına yardım amacıyla plazma ve Novadrol tatbik edilir.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Gözler: Etiketlenen gözleri, göz kapakları açık ve nazik şekilde en az 15 dakika süreli olarak yıkayın. Gözde kontak lens var ise lensleri yıkamaya başladıktan 5 dakika sonra çıkartın daha sonra gözleri yıkamaya devam edin. Medikal destek için bir sağlık merkezini veya ulusal zehir kontrol merkezlerini arayın (Telefon: 114.)

Deri: Temas eden bölgeyi acil olarak en az 15 dakika iyice yıkayın. Medikal destek için bir sağlık merkezini veya ulusal zehir kontrol merkezlerini arayın (Telefon: 114.)

Net Miktarı :
Azami Per. Satış Fiyatı (KDV Dahil) :

İÇİNDEKİLER: Bakır oksiklorid

ZARARLILIK İŞARETLERİ



DİKKAT

ZARARLILIK İFADELERİ (H)

H302: Yutulması halinde zararlıdır.
H332: Solunması halinde zararlıdır.
H410: Sıcak ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ (P)

P102: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
P202: Bütün önlem ifadeleri okunup anlaşılmadan elleçlemeyi.
P264: Elleçlemeden sonra bol su ile iyice yıkayın.
P271: Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanın.
P273: Çevreye verilmemesinden kaçının.
P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/üzü koruyucu kullanın.
P330: Ağzınızı çalkalayın.
P391: Döküntüleri toplayın.
P501: İçerdiği kimyasal atık olarak bertaraf edin.
EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

-Boşalan ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz.
-Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
-Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
-Balıklar için zehirlidir. Yer altı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.

TARIM İLAÇLARI SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
Mentana Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde
No: 1 Halkortent / MERSİN
Tel: +90 324 876 445 / Fax: +90 324 876 45 97
www.mentatarm.com / ynta@mentatarm.com
Ücretsiz V.D. : 6 5 002 5 7 1 1 / Tel. Sic. No: 30-32280

FARUK DENİZ
Şirket Vekili



Uygulama Makinesinin Temizliği

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra uygulama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

BLİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Bağ mididyosisi: 1. uygulama: sürgün boyu 25-30 cm uzunlukta olunca uygulanmalıdır. 2. ve diğer uygulamalar: ilk uygulamadan 15 gün sonra yapılmalıdır. Bölgenin günlük sıcaklık ve yağış ortalamaları, nispi nem, çiğ gibi meteorolojik faktörler dikkate alınarak hastalık enfeksiyonu için uygun koşullar oluştuğunda uygulamalar yapılmalı, koşullar ortadan kalktığı anda uygulamalara son verilmelidir.

Şeftali Yaprak Kıvrıklığı: Tomurcukların kabardığı dönemde bir uygulama yapılır.

Bağda ölüko: Kış uygulaması: Budamadan sonra, gözler uyanmadan hemen önce yapılmalıdır. Yaz uygulaması: 1. Uygulama: sürgünler 2-3 cm olduğunda, 2. Uygulama: sürgünler 8-10 cm olduğunda, 3. Uygulama: sürgünler 25-30 cm'yi bulduğunda yapılmalıdır

Zeytin Halkalı Leke: Marmara Bölgesinde: 1. ilaçlama: Sonbahar sürgünleri görülmeyen hemen önce, 2. ilaçlama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce, Ege Bölgesinde: 1. ilaçlama: Sonbahar sürgünleri görülmeyen hemen önce 2. ilaçlama: İkbahar sürgünleri görülmeyen hemen önce. 3. ilaçlama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce.

Akdeniz Bölgesinde: 1. ilaçlama: Hasattan sonra, 2. ilaçlama: İkbahar sürgünleri görülmeyen hemen önce, 3. ilaçlama: Çiçek somakları belirginleştikten sonra, çiçekler açmadan önce yapılmalıdır.

-Tüm ilaçlamaların yağışların öncesinde veya hemen sonrasında yapılması gereklidir.

Sert çekirdekli meyvelerde yaprak delen (Çil) (Kayısı): 1. Uygulama: Sonbaharda yaprak dökümünden hemen sonra, 2. Uygulama: İkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce (pembe çiçek tomurcuğu döneminde), Kayıslarda ilave olarak, meyvelerde çanak yaprak ve erken organ tablası meyvenin ucuna sıyırılken 3. ilaçlama yapılmalıdır.

Domates Mildiyö: Çevrede domates yapılarında 3-5 mm çapında kahverengi lekelerin alt yüzeyinde beyaz küllü konidi örtüsünün görülmesi ile ilaçlamaya başlanır, 10-12 gün ara ile devam edilir.

Domates Erken Yaprakyanıklığı: İlaçlamaya ilk lekeler görülür görülmez başlanır, iklim koşulları hastalık gelişimi için uygun devam ettiği sürece 10-12 gün ara ile devam edilmelidir.

DİRENÇ YÖNETİMİ: ARYA adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup M1 olarak sınıflandırılmış bir fungisttir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle direnç gelişimini geciktirmek için ARYA'nın aynı sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise farklı etki mekanizmasına sahip (Grup M1 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARŞIYABİLİRLİK DURUMU: Kalsiyum ve Thiamin içeren ürünler ile karıştırılması tavsiye edilmez. Diğer bitki koruma ürünleri ile karışım yapılmadan önce ön karışım testi yapılmalıdır.

15 Eylül 2021

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

ÇİDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KABUL EDİLMİŞTİR

MENTA®

ARYA

Suspansiyon konsantre (SC)

GRUBU	M1	FUNGİSİT (Mantar ilacı)
-------	----	-------------------------

700 g / L Metalik Bakıra Eşdeğer Bakır Oksiklorid

Solunum: Etiklenen kişinin sakınlaşmasını sağlayın ve kişiyi temiz havaya taşıyın. Kişi nefes almıyorsa acilen bir ambulans çağırın ve kişiyi suni teneffüs yapın. Medikal destek için bir sağlık merkezini veya ulusal zehir kontrol merkezlerini arayın (Telefon: 114.)

Sindirim: Acil olarak medikal ve zehir kontrol merkezlerini arayın. Etkilenen kişiyi kusmaya zorlamayın. Kişi eğer içebilecek durumdaysa kişinin ağzını çalkalayın ve 200-300 ml kadar suyu yavaşça içirin. Bilinci açık olmayan kimseye ağzında bir şey vermeyin.

ANTİDÖTÜ VE GEREKLİ BİLGİLER: Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi yapılır.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM): 114
Sadece zehirleme durumlarında arayınız.

DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadık depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörür (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajında satılmak kaydı ile, imalatçılar bitki koruma ürününün kalitesini garanti ederler. İmalatçılar bitki koruma ürününün hatalı depolanması veya hata tatbiki veya tavsiyelere uymadaki eksiklik neticesinde vaki olar zarar için sorumluluk kabul etmezler.

RUHSAT SAHİBİ VE İMALATÇI FİRMA:

MENTA TARIM İLAÇLARI San. ve Tic. Ltd. Şti.
Mersin - Tarsus Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde No:1
Huzurkent
TARSUS / MERSİN
Tel: 0 324 676 45 95 -96 Fax:0 324 676 45 97

TARIM İLAÇLARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Mersin - Tarsus Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde
No: 1 Huzurkent / MERSİN
Tel: +90 324 676 45 95-96 / Fax: +90 324 676 45 97
www.mentatarim.com / info@mentatarim.com
Ülke V.D.: 015 002 6 71 71 / T.C. Şiş. No: 92260

FARUK DENİZ
SİRKÜLERİ

