



T.C.
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ




BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİ
RUHSATNAMESİ

İMAL

Ruhsat No: 8767.....
Ticari Adı : MENTAGARD.....
Aktif Madde ve Oranı : 250 g/l Difenconazole.....
:
Grubu : Fungisit
Fiziki Hali : Açık sarı berrak sıvı.....
Ruhsat sahibinin Adı ve Adresi : MENTA TAR.İL.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ.....
: Mersin- Tarsus Org.San. Böl.1.Cad.No:1.....
: Huzurkent/MERSİN.....
Fabrika veya İmalathanenin işletme
İzni Tarih ve Numarası : 22.05.2006/ 11-178.....
Fabrika veya İmalathanenin adresi : MENTA TAR.İL.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ.....
: Mersin- Tarsus Org.San. Böl.1.Cad.No:1.....
: Huzurkent/MERSİN.....
Ruhsatnamenin geçerli olduğu süre : 02.07.2022 (iki Temmuz ikibinyirmiiki).....
: Tarihine kadar
Düzenleme Tarihi ve Nedeni : 02.07.2012 Emsal.....

5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile Bitki Koruma Ürünlerinin Ruhsatlandırılması Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince yukarıda adı geçen bitki koruma ürününün Türkiye’de imal ve kullanılmasına müsaade edilmiştir.




Dr.Ahmet ARSLAN
Bakan a.
Genel Müdür Yardımcısı V.

İmal Tarihi :
Son Kullanma tarihi:
Şarj No :
Ruhsat Tarih ve No'su: 2.7.2012 / 8767

MENTA

MENTAGARD
Emülsiyon Konsantr (EC)

GRUBU	G1:3	FUNGİSİT (Mantar ilacı)
-------	------	----------------------------

250 g/l Difenoconazole

ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.
EVDE KULLANMAYINIZ
ÇOCUKLARDAN VE GİDALARDAN UZAK TUTUNUZ.
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SİRASINDA HIÇBİRŞEY YEMEYİNİZ. SİGARA İÇMEYİNİZ.
BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.
İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMEK İÇİN, KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.
TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DİŞİNDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.

KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR			
BİTKİ ADI	ZARARLI ORGANİZMA ADI	UYGULAMA DOZU	SON UYGULAMA İLE HASAT ARASI SÜRE
Elma	Karalekesi (<i>Venturia inaequalis</i>)	10 ml / 100 L su	14 gün
Armut	Karalekesi (<i>Venturia pirina</i>)	10 ml / 100 L su	14 gün
Şeker Pancarı	Yaprak Leke Hastalığı (<i>Cercospora beticola</i>)	30 ml /da	14 gün
	Külleme (<i>Erysiphe betae</i>)	20 ml /da	

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI: Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptaki miktarı ile karıştırılır. Uygulama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumdakinden ilağı su depoya ilave edilir. Karıştırılmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. İlağıla tamamen suya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içerisinde kullanınız.

KALİBRASYON: Uygulama öncesinde uygulama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı iyi ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

İLAĞLAMA MAKİNASININ TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçalarının yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemi su kaynaklarının yakınında yapılmamalıdır. Yıkama suyunu ve atıklarını su kaynaklarına boşaltmayınız.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Elma karalekesi
-uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)
-uygulama: Pembe rozet tomurcuğu döneminde (çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde)
-uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce
ve diğer uygulamalar ise iklim koşullarının hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 15 gün arayla yapılmalıdır.
Armut karalekesi
-uygulama: Çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce)
-uygulama: Beyaz rozet döneminde
-uygulama: Çiçek taç yaprakları %70-80 dökülünce
ve diğer uygulamalar: iklim koşulları hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda 10 gün arayla yapılmalıdır.

Net Miktarı :
Azami Per. Satış Fiyatı (KDV Dahil) :

İÇİNDEKİLER: Difenoconazole içerir.

ZARARLILIK İŞARETLERİ



TEHLİKE

ZARARLILIK İFADELERİ (H)
H302: Yutulması halinde zararlıdır.
H318: Cilt tahrişine yol açar.
H319: Ciddi göz hasarına yol açar.
H226: Alevlenir sıvı ve buhar.
H332: Solunması halinde zararlıdır.
H410: Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

ÖNLEM İFADELERİ (P)

P102: Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.
P210: Isıdan/kıvılcımdan/alevden/sıcak yüzeylerden uzak tutun. - Sigara içilmez.
P261: Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını/spreyini solumaktan kaçının.
P270: Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyiniz veya sigara içmeyin.
P280: Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucuyu kullanın.
P501: İçeriği/kabı kimyasal atık olarak bertaraf edin.
EUH401: İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

KULLANIRKEN VE DEPOLANIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Balıklara zehirlidir. Sulara bulaştırmayınız. Ürün artıklarının imhası esnasında sulama veya içmede kullanılan durgun veya akarsu kaynaklarını ilağıla kirlitemeyiniz.
- Arnlara zararlıdır. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.

MENTA
TARIM İLAÇLARI SAN. VE TİC.LTD.ŞTİ.
Mersin-Tarım Organize Sanayi Bölgesi 1. Cadde
No: 1 Huzurkent / MERSİN
Tel: +90 324 676 45 95 96 Fax: +90 324 676 45 97
www.mentatarm.com - menta@mentatarm.com
Uray Y.D.: 615-002-837 / Tic. Sic. No: 32260



Dr. Yunus BAYRAM
Genel Müdür Yardımcısı

27 Ekim 2017
GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR

Şekerpancari yaprak leke hastalığı

Şekerpancari erişkin yapraklarının % 5'inde birer cercospora lekesi görüldüğünde ilk uygulamaya başlanır. 15-20 gün aralıklarla devam edilmelidir.

Şekerpancari küllemesi:

Hastalık belirtileri görüldüncel uygulamaya başlanır ve ihtiyaca göre 20 gün ara ile devam edilir.

DİRENÇ YÖNETİMİ İLE İLGİLİ BİLGİ: MENTAGARD adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup G1:3 olarak sınıflandırılmış bir fungusittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için MENTAGARD'ın aynı sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektirdiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup G1: 3 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞILIRLIK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılarak kullanılabilir. Gerekli görülmesinde bir ön karışım denemesi yapılması önerilir.

MENTAGARD kendinden önce uygulanan veya tank karışımı olarak kullanılan ürünlerden etkilenmez.

MENTA

MENTAGARD

Emülsiyon Konsantr (EC)

GRUBU	G1:3	FUNGUSİT (Mantar İlacı)
-------	------	----------------------------

250 g/l Difenocoazole

Sindirim: Acil olarak medikal ve zehir kontrol merkezini arayın. Etkilenen kişi kusmaya zorlamayın. Kişi eğer içebilecek durumda ise, kişinin ağzını çalkalayın ve 200-300 mL kadar suyu yavaşça içirin. Bilinci açık olmayan kimseye ağızdan bir şey vermeyin.

İLK YARDIM ÖNLEMLERİ: Muhtemel olmamakla birlikte şayet zehirlenmeden şüpheleniliyorsa ilkyardım tedbirlerini alın. Doktor çağırınız veya hastayı ilaç ambalajı veya etiketi ile birlikte doktora götürünüz. İlaç ile temas halinde, yemeden, içmeden ve sigara kullanmadan önce yüz ve ellerinizi yıkayınız. Şayet rahatsızlık hissedilir ise derhal işi bırakınız. İlaç göze gelmiş ise göz kapaklarını açarak, gözünüzü suyla 10-15 dakika süreyle yıkayınız. Eğer yutulmuş ise bol miktarda aktif kömür veriniz. Hastayı, ilaç ambalajı ile birlikte derhal doktora götürünüz.

ANTİDÖT VE TEDAVİSİ: Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

ULUSAL ZEHİR MERKEZİ (UZEM) Tel:114

27 Ekim 2017

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KABUL EDİLMİŞTİR



DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ilacın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgör (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile, imalatçılar ilaclarının kalitesini garanti ederler. Firma ilacın etikette önerildiği şekli, zaman ve dozlarda uygulandığı takdirde etkinliğini garanti eder. İlacın yanlış depolanmasından, yanlış doz ve zamanda uygulanmasından doğabilecek zararlara ilgili olarak sorumluluk kabul etmez.

RUHSAT SAHİBİ VE İMALATÇI FIRMA:

MENTA TARIM İLAÇLARI SAN. ve Tic. Ltd. Şti.
Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi 1. Caddesi No:1
Huzurkent / MERSİN

Tel: 0 324 676 45 95 -96 Fax:0 324 676 45 97

MENTA
TARIM İLAÇLARI SAN. ve TIC.LTD.ŞTİ.
Mersin-Tarsus Organize Sanayi Bölgesi 1. Caddesi No:1 Huzurkent / MERSİN
Tel:+90 324 676 45 95-96 Fax:+90 324 676 45 97
www.mentatarim.com / menta@mentatarim.com
Uray V.D.: 615 002 8377 T.C. Sic. No:32260